


شانت مغزی



تاریخ تدوین : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۹/۲۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۹/۲۸

کد: MH.BR.PE.ICU.۱۲۱

واحد آموزش به بیمار

چرا نیاز به عمل جراحی شانت گذاری

دارم ؟

در صورتیکه علت بیماری هیدروسفالی ناشی از عملکرد مغز در ممانعت از جریان مایع مغزی- نخاعی باشد ، ممکن است با عمل جراحی، برطرف شود. علت بیماری هیدروسفالی شما

توسط جراح مشاور برایتان توضیح داده خواهد شد به منظور جلوگیری از تشکیل بیشتر CSF (مایع مغزی نخاعی) لازم است با انجام عمل جراحی، شانت در بدن شما تعبیه شود. شانت ، وسیله ایی متشکل از لوله و دریچه است. زمانیکه فشار اضافی در مغز ایجاد شود، دریچه باز می شود. مایع اضافی، بدون خطر از طریق لوله های کنار گوش، تخلیه و به سمت گردن و سینه سرازیر میشود و سپس وارد حفره شکمی شده و در آنجا بدون خطر جذب می شود این شیوه، تنها راه رهایی از تشکیل CSF است.

کمتر مایع، از بیرون بدن برنامه ریزی کرد. جراح به شما خواهد گفت که کدام وسیله برای درمان شما، بهترین است.

من به چه نوع اقدامات مقدماتی و درمانی نیازمندم؟

جراح معاینه کاملی از شما بعمل آورده و آزمایشات مورد نیاز را درخواست میکند ، البته در صورت نیاز نوار قلب و عکس قفسه سینه نیز برای شما درخواست خواهد شد. پرستار به شما خواهد گفت که چه زمانی قبل از عمل تان، خوردن و نوشیدن را کنار بگذارید. شما می توانید داروهای متداول تان را مصرف کنید، مگر آنکه موارد دیگری توصیه شده باشد. قبل از عمل مقدار کمی از موی سرتان تراشیده می شود سپس در اتاق عمل پس از بیهوشی و شستشوی ناحیه عمل جراح سوراخی در جمجمه شما ایجاد و شکاف کوچکی نیز در شکم شما ایجاد میکند

سپس لوله ایی را وارد مغز شما کرده و شانت را به آن وصل می کند و بعد زخمهای شما را می بندد.

بعد از عمل جراحی چه اتفاقی برای شما می افتد؟

ممکن است بعد از عمل شما نیاز به مراقبت در بخش ویژه داشته باشید. در غیر اینصورت به بخش منتقل شده و تحت مراقبت پرستاری قرار می گیرید. تا زمانیکه شما کاملاً از حالت بیهوشی خارج شوید، که معمولاً چند ساعت بعد از عمل خواهد بود، ماسک اکسیژن به شما وصل است. شاید لازم باشد به مدت ۲۴ ساعت به صورت دمر بخوابید، اما بلافاصله بعد از دستور جراح، ترغیب به حرکت می شوید. از آنجائیکه معمولاً درد در ناحیه زخم وجود دارد، به شما مسکن داده خواهد شد. شما دو جای زخم خواهید داشت؛

یکی بر روی شکم و دیگری بر روی سر. معمولاً بخیه های زخم سر ۵ روز بعد از جراحی، و بخیه های زخم شکم ۷ روز بعد از جراحی برداشته می شوند. اگر قبل از برداشتن بخیه ها، از بیمارستان مرخص شوید، پزشک و پرستار در روز ترخیص زمان و مکان برداشتن بخیه ها از روی زخم را به شما خواهند گفت.

احساس شما در مدت بهبودی

ممکن است ابتدا که به خانه می روید، احساس خستگی و اضطراب داشته باشید. این حالت عادی است. استراحت در طول روز به شما کمک می کند. داشتن سردرد، حالتی عادی است. در زمان رفتن به خانه به شما مسکن داده خواهد شد. به تدریج میزان فعالیت فیزیکی تان را افزایش دهید. هر زمان که احساس آمادگی کردید به سر کار خود بازگردید. جراح تان به شما خواهد گفت که چه زمانی مجدداً می توانید رانندگی کنید

اگر در زمان استراحت در خانه با هریک از موارد زیر مواجه شدید حتماً با پزشکتان تماس بگیرید:

- (تب) که ممکن است نشانه عفونت باشد
- (غش و تشنج و سردردهای شدید) نشانه افزایش فشار در مغز می باشد
- (استفراغ مکرر) نشانه افزایش فشار در مغز است
- (کسالت و خواب آلودگی)
- تورم یا خارج شدن مایع از محل زخم

با آرزوی بهبودی و سلامتی روز افزون