

## تعریف

**بطن مغزی:** مجموعه‌ای از ۴ ساختار به هم مرتبط در مغز می باشد که از مایع مغزی نخاعی تا مجرای مرکزی نخاع ادامه می یابد. با افزایش سن بطن مغز بزرگ تر و نورون ها از بین می روند.



## IVH:

خونریزی داخل بطنی که اغلب با منشاء شریانی و مویرگی می باشد.

## علل:

- ۱- معمولاً به علت حوادث موتوری و اغلب در محدوده سنی ۳۰-۲۱ سال .
- ۲- متعاقب ضربه های غیر نفوذی شدید به جمجمه .
- ۳- درنوزادان نارس و کم وزن (۲۰۰ گرم یا کمتر) .
- ۴- درنوزاد همراه با دیسترس (زجر) تنفسی / صدمه ی ناشی از هیپوکسی (کاهش اکسیژن بافت) / کاهش یا افزایش فشار خون / افزایش فشاروریدی (سیاهرگی) .

## تشخیص

سی تی اسکن مغزی معمولاً وقوع خونریزی را ثابت می کند و بهترین روش برای مشاهده خونریزی و هماتوم است. همچنین انجام ام ار آی می تواند خونریزی و زمان وقوع خونریزی را نشان دهد.

## پیش آگهی

معمولاً خوب نیست اما شناسایی و درمان به موقع این عارضه تأثیر به سزایی در سرانجام بیماری دارد.

به نام حضرت دوست

# IVH

بیمارستان شهید  
محمد منتظری  
واحد آموزش به بیمار



تاریخ تدوین : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۹/۲۸

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۷/۹/۲۸

کد: MH.BR.PE.ICU.۱۲۷

واحد آموزش به بیمار

## درمان :

\* معمولاً درمان جراحی برای توقف  
خونریزی و بر داشتن خون لخته شده و  
اتصال به درن EVD جهت خروج ترشحات  
انجام میشود .

\* همچنین داروهایی که تورم و فشار مغز  
را کاهش می دهند نیز طبق نظر پزشک  
معالجه استفاده میشود

## علائم شایع :

\$ علائم در بزرگسالان معمولاً به شکل  
سردرد، گیجی، تغییرات ذهنی و کاهش  
سطح هوشیاری بروز میکند .

\$ علائم در نوزادان نارس معمولاً به  
صورت فلج مغزی / تشنج / عقب ماندگی  
ذهنی / ناتوانی‌های رفتاری شناختی / مرگ  
نشان داده میشود .