

تاریخ ابلاغ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۹/۰۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۹/۰۵
کد : MH.BR.PE.NICU.۲۵۷
واحد آموزش به بیمار



علایم خطر نوزادی که باید توجه فراوان به آن شود!!!

بیمارستان شهید محمد منتظری

بخش NICU

۱. زردی ۳۶ ساعت اول پس از تولد. یا طولانی شدن زردی بیش از ۲۰ روز.
۲. مدفوع بیرنگ و ادرار پر رنگ.
۳. جوش های چرکی منتشر در پوست نوزاد.
۴. تنفس های سریع همراه با تو کشیده شدن قفسه سینه. ناله کردن. رنگ پریدگی شدید. یا کبودی نوزاد. کبودی لب ها.
۵. استفراغ مکرر شیرخوار.
۶. تحرک کمتر از حد معمول و بی حالی نوزاد. بی قراری و تحریک پذیری نوزاد.
۷. ترشحات چرکی ناف یا قرمزی اطراف ناف.
۸. تب یا سرد شدن اندام های بدن.
۹. خروج ترشحات چرکی از چشم نوزاد و تورم پلک های نوزاد.
۱۰. کاهش شدید وزن نوزاد.
۱۱. حرکات تشنجی در نوزاد و یا حرکات غیر ارادی مثل اینکه نوزاد به شدت دست و پا بزند. پرش اندام ها که با گرفتن کنترل نشود. سر و چشم های نوزاد به یک طرف بچرخد. چشمک زدن که این حالت چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشد و یا خیره شدن نوزاد به یک نقطه.