

عفونت خونی نوزادی (سپسیس)

نوزادی چیست؟

عفونت خونی یک حالت کاملاً جدی به حساب می آید، که نام دیگر آن مسمومیت خونی یا وجود باکتری در خون است.

علت عفونت خونی چیست؟

در بسیاری از موارد در عفونتهای خونی نوزادی، باکتری ها در طی بارداری و یا در زمان زایمان از مادر به جنین یا نوزاد منتقل می شود.

میکروب هایی که به صورت طبیعی بر روی پوست زندگی می کنند، خیلی راحت از طریق راههایی که ذکر شد وارد جریان خون شده و منجر به بروز عفونت خون می شوند.

عفونت خون نوزادی چه علایمی دارد؟

- کاهش میل به شیر خوردن یا عدم تحمل شیر
- نا آرامی و بدخلقی
- تب یا کاهش دمای بدن

• ضعف و بی حالی

• شلی

• تغییر در ضربان قلب که یا بسیار تند تر از حالت طبیعی یا خیلی کند تر از آن می شود

• تنفس سریع یا اشکال در تنفس

• رنگ پریدگی یا تغییر رنگ پوست

• زردی

• کبود شدن لبها یا مخاط دهان

عفونت خونی نوزادی چگونه تشخیص

داده شده و درمان می شود؟

تست های آزمایشگاهی شامل آزمایش خون و کشت خون و آزمایش ادرار است و باید حتماً به طریقه صحیح و استریل نمونه گیری انجام شود.

برخی اوقات کشیدن مایع نخاعی (مایع کمری)

بر اساس وضعیت کودک و یا عکس برداری از قفسه سینه می باشد.

*** وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در

نوزادان و شیر خواران کوچک مستلزم مراقبت های

ویژه و انجام اقدامات درمانی بیمارستانی می باشد تا

آنتی بیوتیک ها از طریق رگ وارد شوند***

معمولاً قبل از این که تشخیص قطعی شود پزشکان تجویز آنتی بیوتیک را شروع می کنند زیرا تا انجام آزمایشات کامل و نتیجه آنها دو تا سه روز زمان لازم است. لذا عدم شروع درمان و منتظر ماندن برای جواب می تواند منجر به منتشر شدن عفونت در بدن و بروز عواقب وخیمی گردد.

توجه: مادر گرامی لطفاً در حین بستری نوزاد

دست های خود را مرتباً بشویید.

عفونت خونی نوزاد چه عوارضی دارد؟

- اگر عفونت خونی درمان نشود گسترش می یابد و منجر به بروز عوارض بسیار شدیدی می شود.
- عفونت می تواند بر عملکرد اعضای مختلف بدن تأثیر گذاشته و منجر به نارسایی کلیه، بیماری های ریه و صدمات مغزی شود.



بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

واحد آموزش سلامت

عفونت خونی

نوزادی

(سپسیس نوزادی)

تاریخ تدوین: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۹/۱۶

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۹/۱۶

کد: MH.BR.PE.INF.۱۷۶

واحد آموزش به بیمار

- تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند بیش از حد
- تغییر در تن عضلانی (سفتی یا شلی خاص)
- کاهش یا افزایش ضربان قلب نسبت به حد طبیعی
- تورم یا برجستگی ملاحظه ها
- هرگونه تغییر در رفتار یا حرکاتی که شما را نگران کند
- ناله کردن

طول دوره درمان برای عفونت خونی

چقدر است؟

در صورت تایید عفونت خونی یا عفونت ادراری و یا ریوی نوزاد نیاز به دریافت آنتی بیوتیک از طریق رگ به مدت حداقل ۱۰ الی ۱۴ روز دارد و در صورتی که عفونت منجر به مننژیت شود، ممکن است ۲۱ روز درمان انجام شود.

(آنتی بیوتیک های خوراکی در نوزادان بی

تاثیر است)

آیا عفونت خونی قابل پیشگیری است؟

اگرچه تمامی انواع عفونت ها قابل پیشگیری نیستند اما از بعضی از آنها می توان اجتناب نمود. زنان باردار باید از نظر وجود هرگونه عفونت در کانال زایمانی مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر قطعی شد، درمان شوند. حتی اگر خانم بارداری از نظر عفونت چک نشده باشد اما در گروه پر خطر قرار گیرد (مثلا تب حین زایمان، پارگی زود رس کیسه آب، زایمان طولانی، سابقه زایمان نوزاد مبتلا به عفونت) به منظور کاهش خطر انتقال عفونت در طی زایمان باید درمان شود.

چه وقت فرزندانتان رانزد پزشک ببرید؟

اگر یکی از علائم زیر مشاهده شد:

- کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- داشتن تب یا کاهش دمای بدن
- زجر تنفسی یا تنفس غیر عادی
- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- خواب آلودگی