

# ختنه

عمل برداشتن پریوس است، پریوس پوستی است که قسمت انتهایی آلت تناسلی را می پوشاند

## دلایل ختنه کردن:

به طور طبیعی در زیر پوستی که آلت تناسلی کودک را می پوشاند دائما ماده سفید رنگی ترشح می شود، البته این ماده چرک نیست و همچنین خاصیت نرم کنندگی دارد و مانع چسبیدن پوست به سر آلت می شود.

در بعضی از مواقع این ترشحات عفونی شده و پوست سر آلت نیز دچار عفونت می شود در موارد نادر عفونت مزبور مخصوصا در نوزادان و شیر خواران موجب عفونت ادراری می شود.

آمار نشان داده عفونت ادراری در بچه های ختنه نشده به مراتب بیشتر از پسر های ختنه شده است، بنا بر این ختنه میتواند در مواردی از پیدایش عفونت دستگاه ادراری در پسران جلوگیری کند.

## روش های مختلف ختنه کردن:

### ۱. گذاشتن حلقه ی پلاستیکی :

این روش متداول ترین روش ختنه کردن است.

بدین ترتیب که حلقه ی پلاستیکی را روی نوک آلت قرار میدهند و با نخ گره میزنند و ۵ تا ۷ روز آن را به همین حال نگه می دارند در نتیجه پوست جلوی نخ سیاه میشود و با حلقه ی پلاستیکی می افتد.

این روش را معمولا قبل از ۳ ماهگی به کار میبرند، ولی باز هم بسته به نظر جراح ممکن است در نوزادان بیشتر از ۳ ماه از حلقه استفاده شود.

## ۲. ختنه کردن با روش بریدن و دوختن :

در صورتی که عمل ختنه در ۳ ماه اول صورت نگیرد

جراح بعد از ۳ ماهگی با روش بریدن و دوختن ختنه را انجام می دهد بعد از انجام ختنه محل باید به دقت نظارت گردد اگر از محل ختنه چند قطره خون خارج شود مهم نیست ولی اگر خونریزی زیاد باشد، باید هرچه زود تر به پزشک اطلاع داده شود تا از خونریزی جلوگیری نماید.

## چیز هایی که به آن بعد از ختنه کردن نوزادان نیاز دارید:

۱. ترمومتر (تب سنج)
۲. پماد آنتی میکروبی مثل: تترا سایکلین یا جنتامایسین



بیمارستان شهید محمد منتظری

# ختنه



تاریخ تدوین : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۷/۰۹/۰۹

کد: MH.BR.PE.SUM.۱۵۱

واحد آموزش به بیمار

**در صورت وجود هر کدام از موارد زیر حتماً با پزشک تماس بگیرید:**

@. چنانچه کودک بعد از شش تا هشت ساعت ادرار نکرد  
@. اگر درجه حرارت کودک بیش از ۳۷/۸ درجه باشد  
@. ظاهر ناخوش کودک

@. وجود بوی نامطبوع یا ترشح زرد رنگ یا خونریزی زیاد از آلت  
@. تغییر رنگ سر آلت به رنگ سیاه یا آبی

@. هرگونه تورم یا قرمزی در اطراف نوک آلت که بعد از سه روز بدتر شود.

## توجه توجه:

# در صورت تب از قطره یا شربت استامینوفن طبق دستور پزشک استفاده شود

# نخ بخیه خودش جذب میشود و نیاز به کشیدن بخیه نیست.

۳. بدن کودک را حد اقل به مدت یک هفته یا تا زمانی که پوست ترمیم نشده با آب خالی بشویید ، همچنین تا زمانی که بدن کودک بهبود نیافته ، از به کار بردن صابون، لوسیون، پودرو دستمال مرطوب اجتناب کنید .

۴. در طی ۳ الی ۴ روز اول بعد از ختنه اولین پماد آنتی باکتریال مثل تترا سایکلین را بر روی آلت بمالید. این کار را به آرامی انجام دهید چون ممکن است دردناک باشد. اگر خون ریزی رخ داد فشردن محل خونریزی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معمولاً باعث توقف خونریزی میگردد.

۵. در هر بار تعویض پوشک بچه میتوانید روی پوشک در قسمتی که مجاور آلت قرار می گیرد ، پماد تتراسیکلین بمالید

۶. بانداژ و پانسمان محل بعد از ۱۲ ساعت باید خارج شود ، در صورت جدا نشدن

پانسمان ، کودک باید به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در لگن آب نیمه گرم نشاندن شود پس از برداشتن پانسمان ممکن است چند قطره خونریزی داشته باشد که نیاز به درمان خاصی ندارد.

--	--	--	--

# ختنه

تهیه کننده : یوسف صالحی

بیمارستان شهید محمد منتظری