

ضدانعقاد (به انگلیسی: Anticoagulant) دارویی است که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند.

داروهای ضد انعقادی و ضدپلاکتی احتمال لخته شدن خون در سرخرگها، سیاهرگها یا قلب را کاهش می‌دهند. لخته‌ها می‌توانند سبب انسداد جریان خون به عضله قلبی و در نتیجه حمله قلبی شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند سبب انسداد جریان خون به مغز شده و منجر به سکته مغزی گردند. استفاده از داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی در افرادی که در معرض خطر انعقاد خون هستند، به حفظ جریان طبیعی خون کمک می‌کند.

رایج‌ترین قلم دارویی تزریقی از این گروه هپارین است
داروی وارفارین رایج‌ترین شکل خوراکی داروهای ضد انعقاد است.
چهارنمونه از شایع‌ترین‌های داروهای تزریقی ضد انعقاد خون:

هپارین، انوکسپارین، وارفارین و ریواروکسابان

هپارین :

موارد مصرف :

ترومبوز وریدهای عمقی
بعد از اعمال جراحی مانند عمل‌های ارتوپدی و عمومی
پیشگیری از آمبولی در شریان‌ها

چند مورد از تداخلات دارویی :

اسپیرونولاکتون ، پروتامین سولفات ، سفتریاکسون ، سایر ضد انعقاد ها ،مدروکسی پروژسترون ،ویتامین ای ، سیتالوپرام

انوکسپارین

موارد مصرف:

جلوگیری از ایجاد لخته خون، آنژین صدری، سندروم کرونری حاد

منع مصرف :

نارسایی کلیه ، خونریزی فعال، کمی پلاکت خون

بیماری کبدی فعال ، فشار خون بالای کنترل نشده

عوارض جانبی:

تهوع ، هماغوری، تنگی نفس ،اسهال ،ادم ، فیبریلاسیون دهلیزی ،

افزایش پتاسیم خون ،نارسایی قلبی مزمن ، خونریزی شدید

تداخلات دارویی:

ونکومايسين ، سایر ضد انعقاد ها ، سیتالوپرام ، پروتامین سولفات

، مدروکسی پروژسترون و..

هشدارها :

هرگونه خونریزی را سریعاً به پزشک اطلاع دهید

به سایر پزشکان و دندان پزشک مصرف این دارو را اطلاع دهید

در صورت ایجاد مشکل عصبی و تاری دید سریعاً به مراکز

درمانی مراجعه کنید

وارفارین :

موارد مصرف :

وارفارین سبب کاهش تشکیل لخته های خونی می گردد.سکته

قلبی ، امبولی ریوی، بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب

،پیشگیری از سکته مغزی ،تروموز وریدهای عمقی، بیماران دارای

مفاصل مصنوعی

منع مصرف:

بارداری ،حساسیت به دارو ، آنوریسم مغزی ، مسمومیت با

حاملگی ، تهدید به سقط جنین ،پرکاریدیت، بیماران تازه عمل

شده

عوارض جانبی:

تهوع ، استفراغ ، درد شکم ، التهاب کبد ،خونریزی ،کاهش حس

چشایی ،کهبیر

تداخلات دارویی :

پنی سیلین جی ، پروتامین سولفات ، فنی توئین ،مدروکسی

پروژسترون ، ژل رویال ، جینسینگ ، ویتامین ای و سی ،سایر ضد

انعقاد ها ،آسپرین، نوافن و سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج

و...

مصرف در دوران بارداری ممنوع



بیمارستان شهید محمد منتظری

داروهای ضد انعقاد خون



تاریخ تدوین: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۷/۰۹/۱۶

کد: MH.BR.PE.GEN.۲۹۱

واحد آموزش به بیمار

نکات مهم :

چک فاکتور های انعقادی و هموگلوبین و هماتوکریت به صورت

روتین در زمان دریافت ضد انعقاد ها داشته باشید

وارفارین همراه با غذا مصرف نشود

در صورتی که یک نوبت در روز دریافت میکنید در

صورت فراموشی مصرف داروها به محض یادآوری مصرف شود

اما اگر نزدیک به دوز بعدی هستید از آن چشم پوشی کنید

از مصرف بیش از دستور پزشک یا قطع ناگهانی و بدون دستور

پزشک خودداری شود

اگر دو نوبت در روز مصرف میکنید و یکی از آنها را فراموش

کرده اید میتوانید دو دوز را یکجا دریافت کنید

از انجام فعالیت های ورزشی پر بر خورد اجتناب کنید

ریواروکسابان

موارد مصرف :

پیشگیری و درمان ترومبوز ورید های عمقی ، آمبولی ریوی ، فیبرینولاسیون سرخرگی ، بعد از جراحی تعویض مفصل زانو و لگن

منع مصرف :

حساسیت به دارو ، خونریزی فعال

عوارض جانبی :

تهوع ، درد شکم ، سکنه مغزی ، خونریزی ، افزایش آنزیم های

کبدی ، دندان درد ، کمر درد ، عفونت ادراری ، خستگی مفرط

تداخلات دارویی:

آمیودارون ، سایر داروهای ضد انعقاد ، امگا ۳ ، دیگوکسین ،

ناپروکسن ، کاربامازپین ، آلپرازولام ، کاوردیلول

هشدار ها:

در صورت بروز خونریزی و سر درد و تاری دید و گیجی و

سنگوپ و مدفوع قیری رنگ به پزشک اطلاع دهید

همراه با غذا مصرف شود

در بارداری مصرف نشود