

مراقبت از همو واگ

پزشک جراح در حین عمل ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار قرار دهد، تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که گاهی تا چند ساعت بعد از جراحی ادامه دارد را به بیرون از بدن هدایت کند.

باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید به وسیله این لوله ها از بدن خارج شوند. لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود.

به لوله هایی که در محل جراحی گذاشته می شوند "درن" می گویند. این لوله ها بعد از چند روز با نظر پزشک معالج از محل زخم خارج می شوند.

نحوه ایجاد خلأ در درن و تخلیه ترشحات درن :

در صورتی که با درن هایی به شکل زیراز بیمارستان مرخص می شوید، قبل از ترخیص چگونگی تخلیه ترشحات و اندازه گیری مایع درون محفظه را از پرستار سوال کنید. شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید.



بالای درن دو دریچه است، دریچه ای که به شلنگ وصل نیست را باز کنید.



مایع داخل آن را درون ظرف سرم که مدرج است، بریزید و میزان آن را خوانده و بر روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالت تخلیه کنید.

محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید.



مراقب باشید درن از محل خارج نگردد.

*** در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود ***


درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید.



بیمارستان شهید محمد منتظری

مراقبت از درن ها

(همو واگ و کاروگیت)



تاریخ تدوین : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۷/۰۹/۰۱


کد: MH.BR.PE.GEN.۲۲۴

واحد آموزش به بیمار

درن کاروگیت یا شیار دار

شکل این نوع درن ها شبیه به نیم دایره های آکاردئونی تکرار شونده می باشد که این پستی و بلندی ها حالتی شبیه به ناودان را ایجاد می کنند که منجر به خروج ترشحات می شوند.

به محض خیس شدن گازهای ناحیه درن پانسمان آن را تعویض کنید در صورت عدم تعویض پانسمان های روی درن عملکرد درن تحت تاثیر قرار گرفته و گاهی منجر به جمع شدن ترشحات در زخم خواهد شد.



نکته :

- * در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز استریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید.
- * دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند .
- * از وارد کردن فشار و خم شدن لوله ها خوداری کنید .
- * محفظه جهت سهولت تخلیه ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد .
- * درن همیشه باید در حالت خلأ یا شارژ قرار گیرد.
- * دارو ها را طبق دستور پزشک استفاده کنید .
- * جهت پیگیری درمان به پزشک معالج خود مراجعه کنید.
- * در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض پانسمان از پزشک جراح خود سوال کنید.