

عمل لاپاراسکوپي چیست؟

نوعی عمل جراحی است که به جای برش بزرگ چند برش کوچک ایجاد میشود و با لاپاراسکوپ به داخل شکم و لگن با یک مانیتور دسترسی پیدا میکند.

این جراحی در کیسه صفرا، جراحی های زنان، جراحی های روده کبد و اندام های دیگر متداول است. گاهی از لاپاراسکوپي به جز درمان جهت تشخیص هم در مواردی که سونوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی اطلاعات کافی نمیدهد، استفاده میشود.

فواید و مزیت های عمل لاپاراسکوپي:

- ✓ کوچک بودن زخم جراحی
- ✓ ترخیص و بهبودی سریعتر
- ✓ احساس درد و ناراحتی کمتر
- ✓ بیمار سریع تر به فعالیت های
- ✓ روز مره بر میگردد.

عوارض لاپاراسکوپي:

- ✓ تب و لرز
- ✓ درد شکم، احساس درد شانه که ناشی از گازدی اکسید کربن است؛ متداول است.
- ✓ قرمزی و تورم، خونریزی یا ترشح چرکی از محل برش
- ✓ تهوع و استفراغ
- ✓ سرفه های پیایی
- ✓ کوتاه شدن نفس ها
- ✓ عدم توانایی ادرار کردن
- ✓ تشکیل لخته خون
- معمولاً زمانی که بیمار قبلاً جراحی شکم داشته باشد لاپاراسکوپي انجام نمیشود.

امادگی های قبل از لاپاراسکوپي:

- ممکن است داروهای مورد استفاده قبل از جراحی کم یا قطع شوند؛ مثل داروهای رقیق کننده خون، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی مثل اسپرین و ایبوپروفن، ویتامین کا، مت فورمین و داروهای کنترل قند
- در صورتیکه باردار هستید بایستی پزشک خود را در جریان بگذارید
- گاهی به جهت بیهوشی نیاز به اقداماتی نظیر نوار قلب، عکس قفسه سینه، سونوگرافی، و یا مشاوره با متخصص قلب و داخلی و یا باشد.
- حداقل هشت ساعت قبل از عمل باید از خوردن و آشامیدن خودداری شود.
- _ محل عمل تمیز باشد.



بیمارستان شهید محمد منتظری

واحد آموزش سلامت

لاپاراسکوپي



تاریخ تدوین: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۷/۰۹/۱۱

کد: MH.BR.PE.LAP.۳۳۹

مراقبت های پس از جراحی

لاپاراسکوپي:

✓ -مراجعه دو هفته پس از جراحی

به پزشک معالج

✓ -شروع فعالیت های سبک در

اسرع وقت

✓ -پوشیدن لباس های راحت و آزاد

✓ -پیگیری جواب پاتولوژی

✓ -عدم انجام فعالیت های سنگین

✓ -رژیم پرفیبر و مصرف مایعات

جهت جلوگیری از یبوست و زور

زدن

عمل لاپاراسکوپي چگونه انجام میشود؟

پس از بیهوشی، برشی در شکم ایجاد میشود و لوله باریکی به نام کانولا وارد میشود. سپس با استفاده از گاز دی اکسید کربن، و باد کردن محیط باعث دید واضحتر پزشک میشود. دوربین متصل به لاپاراسکوپ، تصاویر را به نمایشگر میفرستد. اندازه و تعداد برش ها بستگی به مشکل بیمار دارد. که به طور معمول یک تا چهار برش ایجاد میشود. ترخیص بیمار بسته به شرایط فرد، بی حسی یا بیهوشی، و نوع عمل متفاوت است.