

## حاملگی خارج از رحم

EP

حاملگی خارج از رحم به حالتی گفته می شود :

که تخمک لقاح یافته در جایی به غیر از جدار داخلی رحم

مستقر شود و شروع به رشد کند

اکثر حاملگی های خارج از رحم در لوله های فالوپ اتفاق می افتد.

اصلی ترین خطری که توسط حاملگی خارج از رحم ایجاد می شود، پارگی است که به خونریزی داخلی منجر می شود.



**عواملی که ریسک ابتلا به حاملگی خارج از رحم را افزایش می دهد:**

- عفونت های لگنی: عفونت های

دستگاه تناسلی زنان اگر به مدت

طولانی درمان نشود باعث التهاب

لوله ها و در نتیجه چسبندگی لوله

ها و انسداد آن ها می شود

داشتن سابقه ی ابتلا به حاملگی خارج

- از رحم: حاملگی خارج از رحم در حاملگی های بعدی تکرار پذیر است.

- سابقه ی انجام عمل جراحی روی

لوله های فالوپ، نقایص مادرزادی و ..

- فیبروم (توده های رحمی) - چسبندگی

های لگنی - وجود iud در رحم

### علائم و نشانه ها

۱- درد در ناحیه ی شکم

۲- عدم وجود قاعدگی

۳- خونریزی یا لکه بینی

۴- تهوع و استفراغ

۵- احساس ضعف و سرگیجه

۶- فشار خون پایین

## حاملگی خارج از رحم



تاریخ تدوین: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۰۹/۰۱

کد: MH.BR.PE.LA.۱۹۵

واحد آموزش به بیمار

## درمان

درمان به دو صورت انجام می شود. اگر توده تشکیل شده کوچک باشد می توان با درمان دارویی آن را از بین برد ولی اگر توده بزرگ باشد

یا باعث پارگی لوله شود, باید از طریق جراحی خارج گردد.



۷- احساس درد در ناحیه شانه و گردن و مقعد

معمولا علائم حاملگی خارج از رحم از شش تا هشت هفته بعد از آخرین قاعدگی طبیعی بروز می کند.

## تشخیص حاملگی خارج از رحم

۱- تست بارداری

۲- سونوگرافی لگنی: بهترین روش

سونوگرافی برای تشخیص حاملگی

خارج از رحم, سونوگرافی داخلی یا واژینال است.