

خونریزی سه ماهه اول

خونریزی در سه ماهه اول بارداری عمدتاً امری شایع و عادی است و حدود ۲۰٪ از زنان در ۱۲ هفته اول بارداری این خونریزی را تجربه میکنند.

اما در برخی موارد به دلیل شدت زیاد دارای عوارضی برای مادر و جنین است

علل این خونریزی ها

۱- لانه گزینی: این نوع خونریزی اغلب به صورت لکه بینی است و در عرض ۱۲ روز اول آبستنی رخ میدهد و بیش از چند ساعت تا چند روز دوام نخواهد داشت.

۲- سقط جنین: حدود نیمی از خونریزی های ۱۲ هفته اول نهایتاً منجر به سقط جنین میشود. اغلب این خونریزی ها مداوم و بیشتر از لکه بینی است. و گاهی همراه با درد زیر شکم و لگن میباشد.

۳- حاملگی مول: بسیار نادر میباشد اما به دلیل احتمال بدخیمی حائز اهمیت است.

۴- تحریک دهانه رحم: به دلیل پرخونی دهانه رحم در بارداری هرگونه تحریک (داشتن نزدیکی یا معاینات سرویکس و...) منجر به لکه بینی خواهد شد که البته اهمیت و نگرانی خاصی ندارد.

۵- عفونت: برخی عفونتهای رحم و واژن میتواند منجر به لکه بینی

شود. (بخصوص سوزاک و کلامیدیا و هرپس)



خونریزی سه ماهه دوم و سوم

اغلب این خونریزیها حتی به صورت لکه بینی به دلیل احتمال زایمان زودرس حائز اهمیت است و باید حتماً با مراجعه به پزشک بررسی شود.



بیمارستان شهید محمد منتظری

خونریزی های دوران بارداری



تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۸

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۷/۰۹/۲۸

کد: ۳۱۳. MH.BR.PE.OBE

واحد آموزش به بیمار

روی دهانه رحم را می پوشاند و با پاره شدن این عروق به هر دلیلی خونریزی بسیار شدیدی رخ میدهد که اغلب خون روشن بوده و بدون درد است

خونریزی در درجه اول خطر جانی برای جنین دارد.

در زمان بروز لکه بینی یا خونریزی باید به پزشک مراجعه کرد

بعد از ۳۷ هفته بارداری:

با خونریزی بیش از لکه و مخصوصا اگر در کسی که که قبلا تحت جراحی رحم یا سزارین قرار گرفته رخ دهد بسیار خطرناک بوده و نیاز به سزارین فوری است. این خونریزی همراه با درد بسیار شدید در ناحیه زیر شکم و رحم است.

دلایل این خونریزی ها شامل:

۱- جفت سر راهی: این خونریزی عموما شدید و فاقد درد و علامت میباشد.

۲- جدا شدگی جفت: جدا شدگی جفت میتواند در هر زمانی چه قبل از زایمان و چه در طول روند زایمان رخ دهد که خطر جانی برای مادر و جنین دارد. این خونریزی اغلب همراه با درد زیر شکم و رحم و کمر میباشد و وجود لخته در واژن نیز علامت دیگر آن است.

۳- پارگی رحم

۴- حاملگی خارج رحمی: این خونریزی اغلب همراه با درد یکطرفه میباشد.

۵- رگهای سرراهی: زمانی رخ میدهد که عروق بزرگ بند ناف یا جفت