



بیمارستان شهید محمد منتظری

سرکلاژ چیست؟



تاریخ تدوین : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تاریخ بازنگری : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
تاریخ بازنگری بعدی : ۱۴۰۷/۰۹/۰۱
کد : MH.BR.PE.OBE.۲۱۳
واحد آموزش به بیمار

نارسایی دهانه ی رحم چیست؟

هنگامی که دهانه ی رحم فرد باردار بدون هیچ گونه احساس درد و انقباض باز شود و موجب دفع جنین نارس و سقط گردد به آن نارسایی گردن رحم (سرویکس) می گویند

سرکلاژ چیست؟

سرکلاژ که دوختن دهانه ی رحم می باشد عمل جراحی است که جهت حفظ جنین و جلوگیری از سقط جنین در افرادی که به نارسایی گردن رحم مبتلا هستند انجام میگیرد، باید توجه داشت که سرکلاژ یک درمان قطعی نیست بلکه با سرکلاژ به بیمار کمک می شود که سقط و زایمان زودرس (قبل از هفته ۳۷ تا ۳۸ حاملگی) کمتر اتفاق بیفتد. این عمل معمولاً در ماه سوم حاملگی (هفته ۱۲ تا ۱۴ حاملگی) انجام می گیرد ، البته مواردی از سرکلاژ اورژانسی نیز انجام میشود و زمانی است که به هر دلیل دهانه ی رحم زودتر باز شده و با استراحت نیز بهبود نیافته است. این عمل در ۸۵ تا ۹۰ درصد موفق و بدون

مشکل انجام میشود. با توجه به اینکه خود این عمل شانس زایمان زودرس و عفونت را کمی افزایش می دهد لازم است تا چکاب های روتین بعدی به طور مرتب انجام گیرد.

عمل سرکلاژ چگونه انجام می شود؟

روش این عمل به این صورت است که

بعد از بی هوشی اپی دورال یا بیهوشی

عمومی پزشک با نخ مخصوص دورتا دور

دهانه ی رحم را می دوزد.

نکات لازم قبل از عمل سرکلاژ (دوختن دهانه

ی رحم):

*بیش از عمل سرکلاژ بررسی کامل سلامت

جنین (غربالگری سه ماهه اول) صورت می

گیرد.

*عفونتهای احتمالی دستگاه تناسلی درمان

میشود.

*عدم نزدیکی با همسر یک هفته قبل از عمل

جراحی رعایت میشود.

* با سونوگرافی سلامت جنین و میزان مایع آمنیوتیک بررسی می شود.

نکات لازم بعد از عمل سرکلاژ: استراحت تا یک روز پس از عمل و استراحت نسبی در ادامه بارداری (محدودیت فعالیت) توصیه میشود. همچنین نداشتن نزدیکی جنسی ترجیحا تا پایان بارداری.

علائم هشدار دهنده پس از عمل جراحی سر کلاژ:

* شل و سفت شدن شکم

* خروج ناگهانی آب گرم از بدن (پاره شدن ناگهانی کیسه آب)

* خون ریزی واژینال

* تهوع و استفراغ

* کمردرد در ناحیه ی زیر شکم

* تب بالای ۳۸ درجه ولرز

موارد ممنوعیت سر کلاژ:

* خون ریزی واژن

* باز شدن دهانه ی رحم

* انقباضات رحمی (شل و سفت شدن شکم)

* ناهنجاری جنین

* پارگی پرده های جنین

نکات قابل توجه:

* انجام این عمل عارضه ای برای جنین ندارد.

* رژیم غذایی مانند یک بارداری طبیعی است

* در صورت انجام زایمان طبیعی نخ

سرکلاژ باید بعد از هفته ۳۷ برداشته

شود ممکن است ترشحات خون روشن

پس از عمل سر کلاژ تا چند روز وجود داشته باشد .

* انجام این عمل بعد از هفته ی ۲۳ با احتمال زیاد عفونت و پارگی کیسه آب همراه است و توصیه نمی شود.

نکته: معمولا خانم هایی که در یک

بارداری نیاز به سرکلاژ پیدا می کنند در

حاملگی های بعدی نیز باید این عمل برایشان انجام شود.

